AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR ZONAL HARGHITA-SUCEAVA
OFICIUL FITOSANITAR HARGHITA Str. Progresului Nr. 22, Miercurea Ciuc, Jud. Harghita, Tel. +40(266)708820, Tel. mobil 0787658205,
Email: ofharghita@anfof.ro

**ANEXA 6.**

Nr. 727 /O/18.06.2026.

Primăria Comunei Ciucsângeorgiu
Intrare / Ieșire Nr. 4442
Ziua 19 Luna 06 Anul 2026.

**BULETIN DE AVERTIZARE**

**Nr. 13 /18.06.2026.**

Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare: ***Monilinia laxa, Monilinia fructigena*** sau **monilioza sâmburoaselor.**

Primele simptome ale bolii apar primăvara, pe florile și frunzele tinere care se ofilesc și se brunifică. Atacul se aseamănă cu efectul înghețurilor târzii, cu aspect opărit, florile și frunzele uscate rămânând pe ramuri tot timpul anului. Pe fructele tinere atacate apar pete brune care cresc treptat și se înmoaie. Mai târziu fructele se lipesc între ele, se mumifiază și rămân în pomi pe timpul iernii. Pe suprafața fructelor apar pete mici cenușii, care sunt forme de rezistență și înmulțire a ciupercii. Primăvara, pe vreme umedă și răcoroasă, conidiile iernate pe fructele mumifiate determină infecția primară pe frunze și flori.

Monilioza apare și la sămânțoase, dar atacul se manifestă mai frecvent pe fructele dezvoltate. Pe suprafața fructelor apar pete rotunde, brune, care se extind repede, în câteva zile fructele putrezesc și cad. Boala se manifestă și în cursul depozitării, determinând putrezirea și înnegrirea rapidă a fructelor.

Al doilea tratament se efectuează la intrarea în pârgă a celui mai timpuriu soi, cu unul din următoarele fungicide:


- **CHORUS 50 WG** în doză de 0,45-0,75 kg/ha sau,
- **FOLICUR SOLO 250 EW (VALOR 250 EW** – a doua denumire comercială) în concentrație de 0,075% (0,75 l/ha în 1000 l apă) sau
- **LUNA EXPERIENCE 400 SC** în doză de 0,5 l/ha sau alte produse pentru protecția plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României.



https://www.botanistii.ro/blog/monilioza-fructelor-de-samburoase-monilinia-laxa/

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR ZONAL HARGHITA-SUCEAVA
OFICIUL FITOSANITAR HARGHITA Str. Progresului Nr. 22, Miercurea Ciuc, Jud. Harghita, Tel. +40(266)708820, Tel. mobil 0787658205,
Email: ofharghita@anfof.ro





https://www.glissando.ro/product/monilioza/
https://www.syngenta.md/news/produse/monilioza-florilor-lastarilor-si-fructelor

Metode durabile: Pentru prevenirea extinderii bolii este necesară tăierea şi arderea ramurilor bolnave împreună cu 10 cm de ramură sănătoasă. Este foarte important ca din toamnă să se adune fructele putrezite sau mumificate din jurul pomilor (sau din pomi) şi să se îngroape sau distruge.


Pentru prevenirea şi combaterea organismelor dăunătoare: ***Rhagoletis cerasi*** sau **musca cireşelor şi vişinelor.**


Musca adultă are corpul lung de 3-4,5 mm, femela fiind puţin mai mare, de culoare brună-negricioasă. Capul, scutelul şi vârful femurelor sunt galbene-roşcate, iar pronotul prezintă dungi galbene şi negre. Larva de 5-6 mm este albă, apodă şi acefală. Prezintă o singură generaţie pe an şi iernează în sol, în stadiul de pupă. Adulţii încep să apară în a doua jumătate a lunii mai, iar la 1-2 săptămâni după împerechere, o femelă depune cu ovipozitorul câte un ou în fructele de cireş sau vişin aflate în pârgă. O femelă poate depune 100-150 ouă, iar după apariţie, larvele se hrănesc cu pulpa fructelor. Fructele atacate se înmoaie, se brunifică şi putrezesc, atât pe pom cât şi după recoltare. După dezvoltarea deplină, larvele se retrag în sol la 2-5 cm adâncime, unde se transformă în pupe, rămânând în acest stadiu până în primăvara anului următor.

Pentru prevenire şi combatere se recomandă efectuarea tratamentelor cu unul din următoarele insecticide:

- **KARATE ZEON (NINJA** – a doua denumire comercială) în concentraţie de 0,015 % sau
- **LASER 240 SC (NEXUBA** – a doua denumire comercială) în concentraţie de 0,06 % sau
- **POLECI (DECA 2,5 EC** – a doua denumire comercială) în doză de 0,3-0,5 l/ha (în concentraţie de 0,03-0,05% în 1000 l apă) sau alte produse pentru protecţia plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR ZONAL HARGHITA-SUCEAVA
OFICIUL FITOSANITAR HARGHITA Str. Progresului Nr. 22, Miercurea Ciuc, Jud. Harghita, Tel. +40(266)708820, Tel. mobil 0787658205,
Email: ofharghita@anfof.ro





https://www.biolib.cz/en/taxonimage/id127658/?taxonid=124836&type=1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kirschfruchtfliege_Rhagoletis_cerasi_2.jpg

Perioada optimă pentru efectuarea primului tratament este când culoarea fructelor virează de la verde în galben, urmând să se repete după 7 zile. Insecticidele recomandate sunt eficiente şi pentru combaterea păduchilor de frunze apărute.

Măsuri alternative de combatere: Folosirea capcanelor feromonale pentru capturarea cât mai multor masculi, sau răspândirea în exces al feromonilor pentru dezorientarea masculilor.

**Alte recomandări:**

Verificaţi, cu mare atenţie recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenţionaţi să aplicaţi amestecuri de produse de protecţie a plantelor!

Luaţi măsurile ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător!

Respectaţi cu stricteţe normele de lucru cu produse pentru protecţia plantelor, normele de protecţie şi securitatea muncii, de protecţie a albinelor şi a animalelor în conformitate cu: Legea nr. 383/2013 a apiculturii cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinul nr. 127/1991 al A.C.A. din România, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 15b/ 3404/1991 al Dep. Pentru Administraţie Locală şi 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor precum şi cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislaţiei, în vederea protecţiei familiilor de albine împotriva intoxicaţiei cu produse pentru protecţia plantelor);

Respectaţi prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranţă a produselor de protecţia plantelor.
Respectaţi obligaţiile ce vă revin conform Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 352/ 636/ 54/ 2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermierii în România, cu modificările ulterioare.

Utilizatorii de produse de protecţie a plantelor trebuie să deţină certificatul de formare profesională dobândit prin instruire privind utilizarea durabilă a produselor de protecţie a plantelor. Cursul este disponibil online, pe platforma FITS: https://fits.anfdf.ro , iar certificatul este valabil 5 ani.

Deţinătorii de echipamente de aplicarea produselor de protecţie a plantelor sunt obligaţi să efectueze inspecţia tehnică periodică a acestor echipamente, odată la 3 ani.

Şef serviciu zonal HR-SV,
Romfeld Păuniţa

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ Oficiul Fitosanitar Harghita www.anfdf.ro

Întocmit,
Molnar Zoltan

**Nume și prenume fermier/asociație/societate comercială**.....
**Domiciliu fermier/sediul social al societății**.....
**(Comuna, județul)**
**Ferma (nume/număr, adresa)**.....

# REGISTRU

## DE EVIDENȚĂ A TRATAMENTELOR CU PRODUSE DE PROTECȚIE A PLANTELOR

| Data efectuării tratamentului (ziua, luna, anul) | Cultura și locul unde este situat terenul | Timpul aplicării/ fenofaza culturii | Tratamentul efectuat | | | | | Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura | Data începerii recoltării produsului agricol | Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Agentul de dăunare: boli/dăunători /buruieni | Denumire ppp folosit | Doza omologată /doza folosită | Suprafața ha | Cantități utilizate (kg, l) | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

(conform Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 - art. 67 alin. (1))

Notă: Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau a administratorului societății.