AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR ZONAL HARGHITA-SUCEAVA
OFICIUL FITOSANITAR HARGHITA Str. Progresului Nr. 22, Miercurea Ciuc,
Jud. Harghita, Tel. +40(266)708820, Tel. mobil 0787658205,
Email: ofharghita@anfof.ro

NÖVÉNYVÉDELMI ELŐREJELZÉS
Nr. 9 / 29.05.2026.

A szilvafákat károsító **szilvamoly (*Cydia funebrana)*** ellen.

A lepke szárny fesztávolsága 12-15 mm, színe szürkésbarna, a peremén harántcsíkokkal, a szárnyak végén pedig egy világosabb területtel. A nőstény a fejlődő gyümölcsökre rakja petéit, amelyekből 1-2 hét múlva kikelnek a lárvák és befúródnak a gyümölcsökbe. Fejlődésükben a lárvák elérik a 10-12 mm hosszúságot, a hátuk téglavörös, a mellső oldaluk halvány rózsaszín. A támadás következtében a gyümölcsök nem fejlődnek tovább, lilás színük lesz és lehullanak. Egy lárva 3-4 gyümölcsöt is károsíthat. Teljes kifejlődés után a lárvák elhagyják a gyümölcsöket és elrejtőznek a fakéreg repedéseibe, ahol bebábozódnak. A báb állapot 8 -12 napot tart, ami után megjelennek a második nemzedék pillangói. Párzás után a zöld gyümölcsökre teszik petéiket, ahonnan 1 hét múlva a lárva befúrja magát a mag közelébe és itt táplálkozik 3 hétig. Teljes kifejlődés után a lárva elhagyja a gyümölcsöt, védett helyre húzódik, majd begubózik és itt fog kitelelni. A támadás könnyen felismerhető a gyümölcsön látható mézgafolyásról, esetleg moníliás penészedésről. A kényszerérett, korán lehulló gyümölcsök megrothadnak, fertőzés forrást jelentve a később érő gyümölcsök számára. A második nemzedék károsításának megelőzésére ajánlatos a következő rovarölő szerek egyikével permetezni:

- **AFFIRM OPTI** 2,5 kg/ha adagolással vagy,
- **CORAGEN (VOLIAM** – a második kereskedelmi elnevezés) de 0,01% koncentrációban (0,1 l/ha adagolással 1000 l vízben) vagy,
- **KARATE ZEON (NINJA** – a második kereskedelmi elnevezés) 0,015% koncentrációban vagy,
- **LASER 240 SC (NEXSUBA** – a második kereskedelmi elnevezés) 0,06% koncentrációban (0,6 l/ha adagolással 1000 l vízben) vagy más, hasonló hatású növényvédőszert is lehet használni, azzal a kitéttel, hogy a naprakész, jóváhagyott, hivatalos listán szerepeljen (Pest Expert).

Az almafákat károsító **almamoly (*Cydia pomonella)*** ellen.

A lepke szárny fesztávolsága 15-22 mm, színe világos szürke, számos, sötétszürke vagy fekete harántcsíkkal. A szárnyak vége felé egy barna terület található, amelyet sárga, zárójel alakzat vesz közre. A nőstény számos petét rak le az ágakra, levelekre vagy a fejlődő gyümölcsökre, amelyekből 1-2 hét múlva kikelnek a lárvák és befúródnak a gyümölcsökbe a csészelevelek vagy a terméskocsány mellett. A rózsaszín lárvák miután elfogyasztották a gyümölcs magházát, más gyümölcsbe vándorolnak át. Egy lárva 4-6 gyümölcsöt is károsíthat. A támadás következtében a gyümölcsök nem fejlődnek tovább és lehullanak. Teljes kifejlődéskor a 16-20 mm hosszú lárvák elhagyják a gyümölcsöket és elrejtőznek a fakéreg repedéseibe, ahol bebábozódnak. 2 hét múlva megjelennek a lepkék, amelyek párzás után, a növekedésben levő almákra rakják petéiket. 1 – 2 hét múlva a kikelt lárvák befúrnak a magházig, ahol 3 – 4 hétig táplálkoznak. A lárvák a táplálék maradványokat és ürüléket a járatokból kitolják, így könnyebben azonosíthatók a károsított gyümölcsök. A kifejlett lárvák elhagyják az almát és a fa kérgében, a repedésekben húzódik meg. Itt vastag falú gubót szőnek maguknak és tavaszig benne maradnak. A megtámadott gyümölcsöket nem lehet tárolni, a járatokban megjelent betegségek miatt megrothadnak.

A második nemzedék károsításának megelőzésére ajánlatos a következő rovarölő szerek egyikével permetezni:

- **AFFIRM** 3-4 kg/ha adagolással 1500 l vízben) vagy,
- **CORAGEN** 0,01% koncentrációban (0,1 l/ha adagolással 1000 l vízben) vagy,
- **KARATE ZEON (NINJA** – a második kereskedelmi elnevezés) 0,015 % koncentrációban vagy,
- **LASER 240 SC** 0,06% koncentrációban (0,6 l/ha adagolással 1000 l vízben) vagy más, hasonló hatású növényvédőszert is lehet használni, azzal a kitéttel, hogy a naprakész, jóváhagyott, hivatalos listán szerepeljen (Pest Expert).

Alternatív védelem: Feromoncsapdák használata a hím lepkék begyűjtéséhez, vagy a gyümölcsösökben levő légtér telítése feromonnal, amely eljárás folyamán a hím lepke nem találja meg a nőstényt.

Az almafákat károsító **levélpirosító alma-levéltetű (*Dysaphis devecta)*** ellen.

A 2,5 mm hosszú tetű színe a szürkétől a rózsaszínig jelenhet meg, de csak úgy vehető észre ha a pirosas, fodrosan besodródott leveleket kibontjuk. A szárnyas ivaros nöstények június végén jelennek meg majd a petéket a rügyek tövébe vagy a fakéreg repedéseibe rakják. Pete formában telelnek, majd rügyfakadás után, a levélkezdemények megjelenésekor az első tetvek megkezdik táplálkozásukat. A szúrás-szívás következtében a kibocsátott jellegzetes enzimek hatására a levelek fodrosódnak és a tetűkoloniára sodródnak, így védve meg azt a külső hatásoktól. A károsított fák levelei megbarnulnak és megszáradnak, rövid hajtásai lesznek, az ágak deformálódnak, a termőrügyek gyengén diferenciálódnak, a gyümölcsök kicsik maradnak

A károsítás megelőzésére vagy kezelésére ajánlatos a következő rovarölő szerek egyikével védekezni:

- **KARATE ZEON (NINJA** – a második kereskedelmi elnevezés) 0,015 % koncentrációban, vagy
- **MOSPILAN 20 SG (KRIMA 20 SG** - a második kereskedelmi elnevezés) 0,45 kg/ha adagolással vagy
- **SIVANTO PRIME 200 SL** 0,9 l/ha adagolással 750-1500 l vízben vagy
- **TEPPEKI (AFINTO** - a második kereskedelmi elnevezés) 0,01 %, koncentrációban (0,15 kg/ha adagolással) vagy más, hasonló hatású növényvédőszert is lehet használni, azzal a kitéttel, hogy a naprakész, jóváhagyott, hivatalos listán szerepeljen (Pest Expert).

Az említett rovarölő szerek hatásosak más levéltetű fajok ellen is.

Egyéb ajánlatok:

- Nagy figyelemmel kövessék a vegyszerek kompatibilitási előírásait abban az esetben ha több vegyszert kevernek össze.

- A környezet védelme érdekében meg kell tenni minden szükséges lépést !

- Szigorúan be kell tartani a növényvédőszerek használati utasításait, a munkavédelmi szabályokat, a méhek védelméről szóló törvényeket (Legea nr. 383/2013, Ordinul nr. 127/1991 al A.C.A., Ordinul comun nr. 45/1991).

- Betartva a törvényes kereteket (Reg. (CE) Nr. 1107/2009; HG nr. 1559/2012; OG nr. 53/2025; HG 1230/2012), a mezőgazdászok akik növényvédő szereket tárolnak, vagy használnak, kötelesek legalább 3 évig megőrizni ezeknek a könyvelési és nyilvántartási dokumentumait és minden vegyszeres kezelés elvégzése után a felhasználó köteles naprakész nyilvántartást vezetnie a kezelésekről.

- Azok a személyek akik növényvédő szereket használnak, szakképzésben kell részesüljenek. A szakképzési bizonyítvány az online elvégezhető tanfolyam (https://fits.anfdf.ro) után szerezhető meg és 5 évig érvényes.

- Aki permetezőgéppel rendelkezik, köteles 3 évenként elvégeztetni a gép időszakos műszaki vizsgálatát.

KÉRJÜK, A NÖVÉNYVÉDELMI ELŐREJELZÉST JÓL LÁTHATÓ HELYRE FÜGGESSZÉK KI, HOGY AZ ÉRDEKELTEK ÉRTESÜLJENEK RÓLA.