AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR ZONAL HARGHITA-SUCEAVA
OFICIUL FITOSANITAR HARGHITA Str. Progresului Nr. 22, Miercurea Ciuc,
Jud. Harghita, Tel. +40(266)708820, Tel. mobil 0787658205,
Email: ofharghita@anfof.ro

ANEXA 6.

Nr. 785 /O/07.07.2026.

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 16 /07.07.2026.

Pentru prevenirea şi combaterea organismelor dăunătoare la culturile de sfeclă de zahăr: **Cercospora beticola** sau **cercosporioza, Erysiphe betae** sau **făinarea** şi **Pegomia betae sau musca cenuşie**.

Cercosporioza se manifestă pe limbul şi peţiolul frunzelor sub forma unor pete aproape circulare, la început galbene şi mai târziu cenuşii, cu diametrul de 1-5 mm. Petele au conturul de culoare brună-roşiatică, iar cu timpul cresc prin unire. Mai târziu ţesuturile petelor se usucă, se rup şi cad, frunza rămânând ciuruită.

Făinarea apare ca un înveliş alb, pulverulent pe suprafaţa tuturor organelor aeriene. Frunzele puternic atacate se ofilesc, se îngălbenesc şi se usucă.



https://www.vegetables.cornell.edu/pest-management/disease-factsheets/cercospora-leaf-spot-of-table-beet/
https://www.strube.net/united-kingdom/products/sugar-beet/cultivation-lexicon/diseases-and-pests/powdery-mildew

Deoarece condiţiile climatice din ultima perioadă favorizează apariţia **cercosporiozei** şi **făinării** la cultura sfeclei, se recomandă efectuarea unui tratament cu unul din următoarele fungicide:

- **DAFNE 250 EC (ILA 250 EC** – a doua denumire comercială) în doză de 0,4 l/ha sau
- **FLOWBRIX (COPPER-FIELD** – a doua denumire comercială) în doză de 2,6 l/ha sau
- **SCORE 250 EC** în doză 0,3 l/ha sau
- **THIOVIT JET 80 WG** doar împotriva făinării în doză de 5 kg/ha.

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR ZONAL HARGHITA-SUCEAVA
OFICIUL FITOSANITAR HARGHITA Str. Progresului Nr. 22, Miercurea Ciuc,
Jud. Harghita, Tel. +40(266)708820, Tel. mobil 0787658205,
Email: ofharghita@anfof.ro

Culturile de sfeclă pot fi dăunate şi de **Musca cenuşie (*Pegomia betae*)**, a cărei larvă minează, roade galerii în frunza de sfeclă reducând suprafaţa foliară şi provocând înnegrirea zonelor dăunate. Pentru combaterea acestui dăunător se recomandă folosirea unui insecticid din următoarele:

- **KARATE ZEON** în doză de 0,15 l/ha sau
- **CYCLONE (FASTER GOLD 50 EC** – a doua denumire comercială) în doză de 0,15 l/ha.

https://www.zerimarlaboratoire.com/predicts-plant-diseases-item/pegomya-betae-en-espinacas-y-similares?srsltid=AfmBOop2gipURSRLpx11FIStmcHGWAI2jNg3TA6RODVrRHqL-B1wCg7E

Alte recomandări:

Verificaţi, cu mare atenţie recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenţionaţi să aplicaţi amestecuri de produse de protecţie a plantelor!

Luaţi măsurile ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător!

Respectaţi cu stricteţe normele de lucru cu produse pentru protecţia plantelor, normele de protecţie şi securitatea muncii, de protecţie a albinelor şi a animalelor în conformitate cu: Legea nr. 383/2013 a apiculturii cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinul nr. 127/1991 al A.C.A. din România, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 15b/ 3404/1991 al Dep. Pentru Administraţie Locală şi 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor precum şi cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislaţiei, în vederea protecţiei familiilor de albine împotriva intoxicaţiei cu produse pentru protecţia plantelor);

Respectaţi prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranţă a produselor de protecţia plantelor.

Respectaţi obligaţiile ce vă revin conform Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 352/ 636/ 54/ 2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermierii în România, cu modificările ulterioare.

Utilizatorii de produse de protecţie a plantelor trebuie să deţină certificatul de formare profesională dobândit prin instruire privind utilizarea durabilă a produselor de protecţie a plantelor. Cursul este disponibil online, pe platforma FITS: https://fits.anfdf.ro , iar certificatul este valabil 5 ani.

Deţinătorii de echipamente de aplicarea produselor de protecţie a plantelor sunt obligaţi să efectueze inspecţia tehnică periodică a acestor echipamente, odată la 3 ani.

Şef serviciu zonal HR-SV

Romfeld Păuniţă

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ Oficiul Fitosanitar Harghita ROMÂNIA www.anfdf.ro

Întocmit,

Molnar Zoltan

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR ZONAL HARGHITA-SUCEAVA
OFICIUL FITOSANITAR HARGHITA Str. Progresului Nr. 22, Miercurea Ciuc,
Jud. Harghita, Tel. +40(266)708820, Tel. mobil 0787658205,
Email: ofharghita@anfof.ro

NÖVÉNYVÉDELMI ELŐREJELZÉS
Nr. 16 / 07.07.2026.

A cukorrépát károsító **Cerkospórás levélragya** ***(Cercospora beticola),*** a **Répa lisztharmat** (***Erysiphe betae***) **és a Cukorrépalégy** (***Pegomia betae***) ellen.

A cerkospórás levélragya a cukorrépa levelein és levélszárain jelentkezik, majdnem kerek foltok formájában. Az 1-5 mm-es foltok az elején sárgák, majd szürkék lesznek, vöröses barna peremmel. A foltok fokozatosan egyesülnek, nőnek, később pedig megszáradnak, kiszakadnak és kiesnek, likacsos kinézetet okozva.

A lisztharmat poros, fehér réteggel vonja be a cukorrépa összes, föld feletti részeit. A súlyosan bevont levelek elhervadnak, megsárgulnak majd elszáradnak.

Mivel az utóbbi napok időjárása kedvező körülményeket teremtett a **cerkospórás levélragya** és a **répa lisztharmat** megjelenésének, ajánlatos védekezésként a következő gombaölő szerek egyikével permetezni:

- **DAFNE 250 EC (ILA 250 EC** – a második kereskedelmi elnevezés) 0,4 l/ha vagy
- **FLOWBRIX** (COPPER-FIELD – a második kereskedelmi elnevezés)2,6 l/ha vagy
- **SCORE 250 EC** 0,3 l/ha vagy
- **THIOVIT JET 80 WG** csak a lisztharmat ellen 5 kg/ha adagolással.

A cukorrépát a **Cukorrépalégy** (***Pegomia betae***) is károsíthatja, amely lárvái a leveleket aknázzák, járatokat rágnak lecsökkentve a levelek felületét és megfeketítve azokat. A védekezéshez a következő rovaritók egyikével ajánlott:

- **KARATE ZEON** 0,15 l/ha vagy
- **CYCLONE (FASTER GOLD 50 EC** – a második kereskedelmi elnevezés) 0,15 l/ha adagolással.

Egyéb ajánlatok:

- Nagy figyelemmel kövessék a vegyszerek kompatibilitási előírásait abban az esetben ha több vegyszert kevernek össze.

- A környezet védelme érdekében meg kell tenni minden szükséges lépést !

- Szigorúan be kell tartani a növényvédőszerek használati utasításait, a munkavédelmi szabályokat, a méhek védelméről szóló törvényeket (Legea nr. 383/2013, Ordinul nr. 127/1991 al A.C.A., Ordinul comun nr. 45/1991).

- Betartva a törvényes kereteket (Reg. (CE) Nr. 1107/2009; HG nr. 1559/2012; OG nr. 53/2025; HG 1230/2012), a mezőgazdászok akik növényvédő szereket tárolnak, vagy használnak, kötelesek legalább 3 évig megőrizni ezeknek a könyvelési és nyilvántartási dokumentumait és minden vegyszeres kezelés elvégzése után a felhasználó köteles naprakész nyilvántartást vezetnie a kezelésekről.

- Azok a személyek akik növényvédő szereket használnak, szakképzésben kell részesüljenek. A szakképzési bizonyítvány az online elvégezhető tanfolyam (https://fits.anfdf.ro) után szerezhető meg és 5 évig érvényes.

- Aki permetezőgéppel rendelkezik, köteles 3 évenként elvégeztetni a gép időszakos műszaki vizsgálatát.

KÉRJÜK, A NÖVÉNYVÉDELMI ELŐREJELZÉST JÓL LÁTHATÓ HELYRE FÜGGESSZÉK KI, HOGY AZ ÉRDEKELTEK ÉRTESÜLJENEK RÓLA.

Nume și prenume fermier/asociație/societate comercială.....
Domiciliu fermier/sediul social al societății.....
(Comuna, județul)
Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU

DE EVIDENȚĂ A TRATAMENTELOR CU PRODUSE DE PROTECȚIE A PLANTELOR

Data efectuării tratamentului (ziua, luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării/ fenofaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunători /buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(conform Reguiamentului (CE) nr. 1107/2009 - art. 67 alin. (1))

Notă: Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau a administratorului societății.