AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR ZONAL HARGHITA-SUCEAVA
OFICIUL FITOSANITAR HARGHITA Str. Progresului Nr. 22, Miercurea Ciuc,
Jud. Harghita, Tel. +40(266)708820, Tel. mobil 0787658205,
Email: ofharghita@anfof.ro

Primăria Comunei Ciucsângeorgiu
Intrare/Ieșire Nr. 4576
Ziua 15 Luna 07 Anul 2026

ANEXA 6.

Nr. 819 /O/15.07.2026.


BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 19 /15.07.2026.

Pentru prevenirea şi combaterea organismelor dăunătoare: ***Ostrinia nubilalis*** sau **sfredelitorul porumbului**.

Adultul are corpul de 13-15 mm, cu anvergura aripilor de 25-30 mm lungime şi prezintă dimorfism sexual. Femela este mai mare, cu abdomenul rotunjit terminal şi de culoare gălbuie deschisă, iar aripile anterioare sunt de culoare galbenă deschisă, cu 3 dungi transversale dispuse în zig-zag. Masculul este mai mic, abdomenul terminal este mai ascuţit, având culoarea mai închisă, de nuanţe maronii, cu femurele celei de-a doua pereche de picioare îngroşate şi lăţite. Oul este de culoare albă sidefie, turtit, neted şi grupat în ponte depuse pe partea inferioară a frunzelor, în treimea superioară a plantelor, fiecare pontă având în medie 22 ouă. Larva este o omidă, de 2-3 mm, iar la completa dezvoltare are 15-25 mm lungime, de culoare albă-cenuşie, uneori cu o nuanţă roşcată. Pe partea dorsală, în regiunea mediană prezintă o dungă mai închisă la culoare, iar capsula cefalică, placa pronotală şi segmentul anal sunt puternic chitinizate. Pupa este de culoare brună, cu 4 spini uşor curbaţi în zona terminală a abdomenului.

Fluturele este nocturn, cu larve care la început se hrănesc pe frunze, iar apoi pătrund şi sapă galerii în tulpină, pedunculul ştiuletelui şi, ulterior, în ştiulete. Atacul slăbeşte planta (frângerea tulpinilor, reducerea toleranţei la secetă) şi favorizează instalarea mucegaiurilor de depozit prin rănile provocate. În general se dezvolta 1 generaţie pe an, cu zbor al adulţilor eşalonat pe parcursul verii. Iernează în stadiul de larvă.





https://agrointel.ro/269140/sfredelitorul-porumbului-ostrinia-nubilalis-semne-combatere

Pentru prevenire şi combatere se recomandă controlul vizual al pontelor pe faţa inferioară şi superioară a frunzelor situate deasupra şi sub inserţia ştiuletelui şi controlul plantelor pentru prezenţa larvelor tinere şi a galeriilor în tulpină. Dacă se observă 10-18% din plante cu ponta depusă, se recomandă efectuarea unui tratament cu unul din următoarele insecticide:

- **CORAGEN (VOLIAM** - a doua denumire comercială) în doză de 125 ml/ha sau,
- **INAZUMA** în doză de 0,15-0,2 kg/ha sau,
- **POLECI (DECA 2,5 EC** - a doua denumire comercială) în concentraţie de 0,03-0,05 %, sau alte produse pentru protecţia plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR ZONAL HARGHITA-SUCEAVA
OFICIUL FITOSANITAR HARGHITA Str. Progresului Nr. 22, Miercurea Ciuc,
Jud. Harghita, Tel. +40(266)708820, Tel. mobil 0787658205,
Email: ofharghita@anfof.ro

Pentru prevenirea şi combaterea organismelor dăunătoare*: **Rhopalosiphum maidis*** sau **păduchele verde al porumbului.**

Afidă de culoare verde-albăstruie, cu cap şi torace mai închise la culoare, formând colonii dense pe frunze, panicul şi, uneori, pe ştiuleţi. Se dezvoltă cu precădere în perioade calde şi secetoase, în lanuri dese, slab aerisite, de la sfârşitul lunii iunie şi pe parcursul lunii iulie. Prin înţepare şi sugere de sevă provoacă îngălbenirea, răsucirea şi ofilirea frunzelor, afectează polenizarea când atacă paniculul şi favorizează apariţia fumaginei pe rouă de miere secretată.

Pentru prevenirea pagubelor se recomandă efectuarea unui tratament, cu unul din următoarele insecticide:

- **KARATE ZEON (NINJA** - a doua denumire comercială) în doză de 0,15 l/ha) sau
- **POLECI (DECA 2,5 EC** - a doua denumire comercială) în concentraţie de 0,03-0,05 %, alte produse pentru protecţia plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

Se consideră infestată o plantă cu peste 20 de afide. Se recomandă intervenţia atunci când infestarea este generalizată în cultură (nu izolată pe margini de parcelă) şi coincide cu fenofazele sensibile (înflorit–polenizare–formarea ştiuletelui). Se acordă atenţie condiţiilor de secetă şi temperaturi ridicate, care favorizează explozia populaţională a dăunătorului.

Alte recomandări:

Verificaţi, cu mare atenţie recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenţionaţi să aplicaţi amestecuri de produse de protecţie a plantelor!

Luaţi măsurile ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător!

Respectaţi cu stricteţe normele de lucru cu produse pentru protecţia plantelor, normele de protecţie şi securitatea muncii, de protecţie a albinelor şi a animalelor în conformitate cu: Legea nr. 383/2013 a apiculturii cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinul nr. 127/1991 al A.C.A. din România, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 15b/ 3404/1991 al Dep. Pentru Administraţie Locală şi 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor precum şi cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislaţiei, în vederea protecţiei familiilor de albine împotriva intoxicaţiei cu produse pentru protecţia plantelor);

Respectaţi prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranţă a produselor de protecţia plantelor.

Respectaţi obligaţiile ce vă revin conform Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 352/ 636/ 54/ 2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermierii în România, cu modificările ulterioare.

Utilizatorii de produse de protecţie a plantelor trebuie să deţină certificatul de formare profesională dobândit prin instruire privind utilizarea durabilă a produselor de protecţie a plantelor. Cursul este disponibil online, pe platforma FITS: https://fits.anfdf.ro , iar certificatul este valabil 5 ani.

Deţinătorii de echipamente de aplicarea produselor de protecţie a plantelor sunt obligaţi să efectueze inspecţia tehnică periodică a acestor echipamente, odată la 3 ani.

Şef serviciu zonal HR-SV,

Romfeld Păuniţa

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
Oficiul Fitosanitar Harghita
ROMÂNIA

Întocmit,

Molnar Zoltan

Nume și prenume fermier/asociație/societate comercială.....
Domiciliu fermier/sediul social al societății.....
(Comuna, județul)
Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU

DE EVIDENȚĂ A TRATAMENTELOR CU PRODUSE DE PROTECȚIE A PLANTELOR

Data efectuării tratamentului (ziua, luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării/ fenofaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunători /buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(conform Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 - art. 67 alin. (1))

Notă: Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau a administratorului societății.