AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR ZONAL HARGHITA-SUCEAVA
OFICIUL FITOSANITAR HARGHITA Str. Progresului Nr. 22, Miercurea Ciuc,
Jud. Harghita, Tel. +40(266)708820, Tel. mobil 0787658205,
Email: ofharghita@anfof.ro

NÖVÉNYVÉDELMI ELŐREJELZÉS
Nr. 23 /24 .08.2026.

A szőlőt károsító **szőlő lisztharmata (*Uncinula necator*)** ellen.

A betegség a növény minden zöld szervén megjelenik. A leveleken a támadás egy fehéres micélium formájában jelentkezik, amely a levéllemez mindkét oldalát beboríthatja. A micélium alatti szövetek idővel elbarnulnak. A hajtásokon a támadás csak addig jelentkezik, amíg azok zöldek. A fiatal bogyókon a támadás egy fehéres pehely megjelenésével nyilvánul meg, a teljes felületen. A bogyók többé nem fejlődnek, később megrepednek, és a magvak láthatóvá válnak. A gomba évről évre a nyár folyamán kialakuló téli rügyek belsejében található ellenálló micéliumon keresztül terjed.

Mivel a szőlő az elsődleges fertőzések kialakulásának kedvező fenofázisában van, javasolt egy megelőző kezelés alkalmazása az alábbi gombaölő szerek egyikével:

- **KUMULUS DF** 0,3%-os koncentrációban, vagy
- **SERCADIS** 0,15 l/ha dózisban, vagy
- **TEBUSTAR EW (MYSTIC TOP** – második kereskedelmi elnevezés) 0,04%-os koncentrációban (0,4 l/ha dózisban), vagy
- **THIOVIT JET 80 WG** 0,3%-os koncentrációban (3 kg/ha dózisban), vagy más, hasonló hatású növényvédőszert is lehet használni, azzal a kitéttel, hogy a naprakész, jóváhagyott, hivatalos listán szerepeljen (Pest Expert).

Egyéb ajánlatok:

- Nagy figyelemmel kövessék a vegyszerek kompatibilitási előírásait abban az esetben ha több vegyszert kevernek össze.

- A környezet védelme érdekében meg kell tenni minden szükséges lépést !

- Szigorúan be kell tartani a növényvédőszerek használati utasításait, a munkavédelmi szabályokat, a méhek védelméről szóló törvényeket (Legea nr. 383/2013, Ordinul nr. 127/1991 al A.C.A., Ordinul comun nr. 45/1991).

- Betartva a törvényes kereteket (Reg. (CE) Nr. 1107/2009; HG nr. 1559/2012; OG nr. 53/2025; HG 1230/2012), a mezőgazdászok akik növényvédő szereket tárolnak, vagy használnak, kötelesek legalább 3 évig megőrizni ezeknek a könyvelési és nyilvántartási dokumentumait és minden vegyszeres kezelés elvégzése után a felhasználó köteles naprakész nyilvántartást vezetnie a kezelésekről.

- Azok a személyek akik növényvédő szereket használnak, szakképzésben kell részesüljenek. A szakképzési bizonyítvány az online elvégezhető tanfolyam (https://fits.anfdf.ro) után szerezhető meg és 5 évig érvényes.

- Aki permetezőgéppel rendelkezik, köteles 3 évenként elvégeztetni a gép időszakos műszaki vizsgálatát.

KÉRJÜK, A NÖVÉNYVÉDELMI ELŐREJELZÉST JÓL LÁTHATÓ HELYRE FÜGGESSZÉK KI, HOGY AZ ÉRDEKELTEK ÉRTESÜLJENEK RÓLA.

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR ZONAL HARGHITA-SUCEAVA
OFICIUL FITOSANITAR HARGHITA Str. Progresului Nr. 22, Miercurea Ciuc,
Jud. Harghita, Tel. +40(266)708820, Tel. mobil 0787658205,
Email: ofharghita@anfof.ro

NÖVÉNYVÉDELMI ELŐREJELZÉS
Nr. 24 / 24.08.2026.

A káposztaféléket károsító **káposzta fekete földibolhája, (*Phyllotreta atra*)** ellen.
A kifejlett bogár 2–3 mm hosszú, hosszúkás-ovális testű, fekete színű, enyhe zöldes-kékes fémfényű. Csápjai és lábai szintén feketék. A pete ovális, sárgásfehér színű. A kifejlett lárva teste megnyúlt, sárgásfehér, feje fekete és fényes. A faj évente egy nemzedéket fejleszt és kifejlett alakban telel át, a talajon maradt növényi maradványok alatt. A telelőhelyről a bogarak korán, jellemzően március végén vagy április elején bújnak elő, és eleinte vadon élő keresztesvirágúakon (mustár, őszi repce, vadretek) táplálkoznak. Ezt követően áttelepednek a termesztett kultúrákra – például a frissen kelt vagy ültetett káposzta- és karfiolpalántákra –, ahol a kártétel különösen agresszív lehet. A peték lerakása a talajba, a tápnövények körül történik, a kikelt lárvák pedig a növények gyökerén táplálkoznak. Az új bogarak pedig mintegy két héttel a bebábozódás után jelennek meg, a nyár vége felé, majd a levelek felső epidermiszét rágják meg, apró, kerek lyukakat okozva. Beavatkozás javasolt, ha a lárvasűrűség eléri a körülbelül 3 lárva/növény értéket.

A káposztát károsító, **csíkos repceföldibolha, (*Phyllotreta nemorum)***.

A kifejlett rovar teste ovális, 2,5–3,5 mm hosszú, fényes fekete színű, a szárnyfedőkön pedig egy-egy sárga hosszanti sáv található. A hátsó lábak fejlettebbek, és ugrásra alkalmasak. A peték ovális alakúak, fehéres-sárgás, áttetsző (hialin) színűek, 0,3 mm hosszúak. A lárva sárgás színű, 4–5 mm hosszú.

Évente egy nemzedéke fejlődik, és kifejlett rovar (imágó) alakban telel át az avarban. A telelő egyedek április–májusban hagyják el a telelőhelyüket, különböző keresztesvirágúakon táplálkoznak, majd egyenként rakják le petéiket a leveleken, az erek tövénél. A 10–14 nap múlva kikelő lárvák a fiatal szárak vagy a levélnyelek aknázásával táplálkoznak. 3 hét elteltével a talajban bebábozódnak, majd 2 hét múlva megjelennek a kifejlett egyedek.

A megelőzés és a védekezés érdekében az alábbi rovarölő szerrel javasolt kezelést végezni:

- **DECIS EXPERT 100 EC (NUYARD** – a második kereskedelmi elnevezés) 0,075 l/ha adagolással vagy más, hasonló hatású növényvédőszert is lehet használni, azzal a kitétttel, hogy a naprakész, jóváhagyott, hivatalos listán szerepeljen (Pest Expert).

A károsítás gazdasági küszöbértéke növényenként 1-2 kifejlett rovar, vagy ha a növények 10 %-a károsítva van. Ez a küszöbérték elérése után ajánlatos a kezeléseket elvégezni, reggel vagy este, amikor a bolhák kevésbé aktívak és kevésbé ugrálnak.

Egyéb ajánlatok:

- Nagy figyelemmel kövessék a vegyszerek kompatibilitási előírásait abban az esetben ha több vegyszert kevernek össze.

- A környezet védelme érdekében meg kell tenni minden szükséges lépést !

- Szigorúan be kell tartani a növényvédőszerek használati utasításait, a munkavédelmi szabályokat, a méhek védelméről szóló törvényeket (Legea nr. 383/2013, Ordinul nr. 127/1991 al A.C.A., Ordinul comun nr. 45/1991).

- Betartva a törvényes kereteket (Reg. (CE) Nr. 1107/2009; HG nr. 1559/2012; OG nr. 53/2025; HG 1230/2012), a mezőgazdászok akik növényvédő szereket tárolnak, vagy használnak, kötelesek legalább 3 évig megőrizni ezeknek a könyvelési és nyilvántartási dokumentumait és minden vegyszeres kezelés elvégzése után a felhasználó köteles naprakész nyilvántartást vezetnie a kezelésekről.

- Azok a személyek akik növényvédő szereket használnak, szakképzésben kell részesüljenek. A szakképzési bizonyítvány az online elvégezhető tanfolyam (https://fits.anfdf.ro) után szerezhető meg és 5 évig érvényes.

- Aki permetezőgéppel rendelkezik, köteles 3 évenként elvégeztetni a gép időszakos műszaki vizsgálatát.

KÉRJÜK, A NÖVÉNYVÉDELMI ELŐREJELZÉST JÓL LÁTHATÓ HELYRE FÜGGESSZÉK KI, HOGY AZ ÉRDEKELTEK ÉRTESÜLJENEK RÓLA.